




 FARMAKOM

Since 1995

СХІЗАНДРИН®

Багатофункціональний рослинний адаптоген з протизапальною і антифібротичною активністю для патогенетичної терапії захворювань печінки

- Пригнічує окислювальний стрес
- Гальмує перекисне окислення ліпідів мембран клітин
- Попереджає апоптоз гепатоцитів
- Зменшує вираженість некрозу і запальної реакції в паренхімі печінки
- Гальмує розвиток фіброзу печінкової тканини




ВИСОКИЙ ПРОФІЛЬ БЕЗПЕКИ,
ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ



відповідністю стандартів виробництва міжнародним вимогам ISO 9001 та ISO 22 000



Раціональна терапія НАЖХП / НАСГ^{1,2}



Ефективність дієтичних і фізичних заходів повинна оцінюватися через 6 міс., якщо вони виявилися неефективні, необхідно розглянути питання про призначення додаткової медикаментозної терапії.


Лікарські препарати, націлені на інсульнорезистентність, такі як тіазолідиніони та метформін, схвалені для лікування діабету, а не для НАЖХП/НАСГ, і повинні розцінюватися як експериментальні.

Антиоксиданти і антифібротичні препарати, такі як вітамін Е і пентоксифілін, не були схвалені для лікування НАСГ/НАЖХП і повинні розцінюватися як експериментальні.

Клінічні ефекти СХІЗАНДРИНУ®



Може призначатися не лише в стадії активації запального процесу в тканинах і печінці, а й на етапі підтримуючої терапії для запобігання прогресування захворювання³



Хронічні вірусні гепатити В і С

- Наявність протипоказань до ПВТ
- Неefективність до раніше проведених курсів ПВТ
- Рецидиви після проведення ПВТ
- В якості терапії супроводу ХВГ
- Наявність супутнього стеатозу печінки

Гепатити невірусної етіології

- НАЖХП, у тому числі неалкогольний стеатогепатит з ознаками фіброзу печінки різного ступеня
- Алкогольна хвороба печінки
- Лікарсько-індуковані ураження печінки

Склад: СХІЗАНДРИН - 25,0 мг



Цироз печінки без ознак декомпенсації

(клас A за Child-Pugh)

По 1-2 таблетки 3 рази на день після прийому їжі.

Курс прийому — 3 - 6 місяців.

Рекомендації щодо споживання: сприяє нормалізації функціонування печінки. Схізандрин[®] проявляє виражену гепатопротекторну, метаболічну, гіпохолестеринемічну, антитоксичну дію, багатоплановий антиоксидантний ефект. Схізандрин[®] - біологічно активна сполука групи лігнанів лимонника китайського. Під впливом Схізандрину[®] відновлюються функції гепатоцитів при ураженніх печінки різної етіології, нормалізується рівень печінкових ферментів, знижується активність маркерів цитолізу, холестазу, імунного запалення. Схізандрин[®] відновлює патоморфологічні порушення структури печінкової тканини, знижує активність аланінамінотрансферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази. Схізандрин[®] пригнічує продукцію високочутливого С-реактивного протеїну (СРП), фактора некрозу пухлини (ФНП-α) активними нейтрофілами, купферовськими клітинами і макрофагами, сприяє зменшенню вільнорадикальних процесів, пригніченню окисного стресу, викликаного порушенням функцій мітохондрій, тим самим запобігаючи некрозу і апоптозу гепатоцитів. Схізандрин[®] сприяє нормалізації симптомів печінкової дисфункциї (важкість у правому підребер'ї, диспептичні явища, у т. ч. метеоризм, порушення апетиту, гіркота в роті, нудота), зменшенню проявів астенічного синдрому, підвищенню толерантності до фізичних навантажень у пацієнтів при наявності стеатогепатиту. **Рекомендовано приймати:** дорослим по 1-2 таблетки три рази на день після прийому їжі. Курс прийому – 3 місяці. В подальшому тривалість застосування узгоджується з лікарем. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період грудного вигодування, дитячий вік до 18 років, гостра печінкова недостатність, декомпенсований цироз печінки. З обережністю призначати при загостренні хронічного гастриту, холециститу, панкреатиту. **Форма випуску:** таблетки по 250 мг №30. Дієтична добавка до раціону харчування. Не є лікарським засобом. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/16432 від 13.05.2016 р. Більш повна інформація представлена в інструкції виробника. Інформація призначена для медичних фахівців.

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком», Україна, м. Харків. Тел./факс: +380577177396, www.farmakom.ua

1. Глобальные Практические Рекомендации Всемирной Гастроэнтерологической Организации - июнь 2012. Неалкогольная Жировая Болезнь Печени и Неалкогольный Степатогепатит.
2. Клинические рекомендации EASL-EASD-EASO по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени. Journal of Hepatology, 2016, том 64, с.1388-1402. 3. Фадєєнко Г.Д., Колеснікова О.В., Соломенцева Т.А. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна. Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту. Гастроентерологія, том 52, №3, 2018, с.33-38. 4. Колеснікова О.В. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна. Погляд на фіброз печінки у світлі розуміння сучасних механізмів його розвитку. Гастроентерологія, том 53, №2, 2019, с.17-26.